

QUELQUES LICHENS DE L'HERBIER DU MUSÉUM
RÉCOLTÉS EN AFRIQUE OCCIDENTALE PAR M. AUG. CHEVALIER,
DÉTERMINÉS
PAR M. BOULY DE LESDAIN.

Ces récoltes ont été faites de septembre à novembre 1930, les unes à la Côte d'Ivoire, les autres en Guinée française.

Physcia picta (Sw.) Nyl. — Sur les vieux troncs de Palmier *Elæis*, qu'il recouvre d'un enduit blanc verdâtre. Conakry (Guinée franc.).

Usnea sp. — Sur les branches d'arbres et d'arbustes, à 1.400 m. d'altitude. Mali (Guinée franc.). Commun aux hautes altitudes du Fouta-Djalon.

Ramalina maculata Müll. Arg. var. *tenuis* Müll. Arg.

Au bord de la mer, sur les buissons morts tués par l'eau salée et les embruns, à la limite des hautes marées. Descend au ras du sol et vit même sur les touffes d'une Cypéracée halophile desséchée, le *Remirea maritima*.

Sur la plage entre Grand-Bassam et Petit-Bassam (Côte d'Ivoire).

Graphis sp. — Sur les troncs d'arbre à écorce lisse. Conakry (Guinée fr.).

***Parmentaria Chevalieri* B. de Lesd., sp. nov.**

Thallus *K leviter flavescens, cartilagineus, cinereo-glaucus, crassiusculus, lævigatus, continuus, nitidus.*

Stromata 1,5^{mm} *lata, emergentia, hemisphærica, numerosa, dispersa vel confluentia, velamine thallino omnino tecta. Perithecia nigra immersa, ostiolo communi prædita, demum denudato, umbilicato nigro que, nucleo albo. Paraphyses graciles numerosæ, ramosæ, asci cylindrici, apice leviter incrassati; sporæ 4-næ. uniseriales, 66-129 × 35-36 µ, diu hyalinæ, demum fuscæ, murali-divisæ, cellulis numerosis. Gelatina hym. I vinose rubet.*

Côte d'Ivoire : entre Abengourou et Bondoukou, dans la savane arborée, à peu de distance de la limite N. de la forêt dense, sur les troncs d'arbres.

Le Gérant, J. CAROUJAT.